

SYMPTOMES OBJECTIFS DES NOUVEAU-NÉS ET
=====

LEUR TRAITEMENT HOMOEOPATHIQUE
=====

Commentaires du Dr SCHMIDT

sur le travail du Docteur Bourgarit

Travail parfait, mais un questionnaire pour enfants, de la part d'un pédiatre aussi averti que compétent comme le Dr Bourgarit, aurait été très apprécié. Voici quelques idées pour vous aider dans l'examen des enfants, pour des manifestations aiguës et chroniques, en tenant compte surtout des symptômes objectifs trouvés dans Clarke, "40 ans de pratique", Kent et Knerr, Leadam, Hartmann et Jahr. Commençons par le côté sexuel par exemple :

P Il est assez fréquent de voir des petits garçons se "tripoter" les parties. Bien sûr, il faut être sûr qu'il a été décalotté à la naissance et qu'il n'y a pas d'adhérences préputiales ni de smegma, sinon ce symptôme peut nous permettre de penser à Acon., bell., bufo., canth., Hyosc., Merc. et Stram.

S'il se touche au moment de crises convulsives, ce sera stram.

On peut aussi penser à l'onanisme dans les deux sexes, mais c'est vraiment rare avant 9 ou 10 ans.

Parmi les symptômes objectifs, nous aurons l'hydrocèle, qui ne réclame de traitement que si elle est volumineuse, car elle est fréquente chez les nouveau-nés et se résorbe le plus souvent spontanément par la suite; les érections la nuit, qui sont cependant à noter si elles sont répétées et surtout si elles troublent le sommeil, avec : aloe, Lach., Merc. et Tub. comme remèdes.

La cryptorchidie où CALC., CALC-P., et SIL. sont les trois grands remèdes auxquels il faut penser.

Pensez aux phimosis ou paraphimosis, dont les remèdes sont indiqués au Répertoire, page 708 :

Phimosis : acon., Arn., calad., Calc., Cann-s., Canth., Cinnb., cycl., Dig., Ham., Hep., jac., Lyc., MERC., nat-m., NIT-AC., Rhus t., sabin., sep., Sulph., sumb., thuj.

Et éventuellement les paraphimosis : bell., Coloc., kali i., Lach., MERC., Merc-c., nat-m., NIT-AC., Rhus t., sep., thuj.

Chez les petites filles, les vulvo-vaginites : page 722 et qui répondent à calc., Cann-s., Cub., MERC., merc-i-f., Puls., senec., SEP.

Chez les petites filles où les règles apparaissent beaucoup trop prématurément, bien avant 10 ans par exemple : page 724 : ambr., Ant-c., bell., Calc-p., canth., Caust., Cham., chin., cocc., coc-c., ferr., hyosc., ip., kali c., lyc., merc., nit-ac., Phos., Puls., rhus t., Sabin., sec., Sil., sulph.

~ Voyez aux généralités, dans le Répertoire, à émaciation, les remèdes qui y correspondent, ainsi que le marasme et l'a-threpsie, les enfants qui ne profitent pas à pining boys - p. 1358 : AUR., LYC., Nat-m., TUB.

L'apparence de petits vieux - p. 374 - (old looking) rubrique où il faudra ajouter : Chin., Morph., et Ter.

I Les enfants hurleurs et pleureurs : Coff., Cham., bell., acon..

Enfants agités et ne pouvant être calmés : bell., acon., coff..

Enfants furieux qui donnent des coups de pied et se démènent : ant-c.

Vous trouverez dans le Répertoire, les fontanelles qui ne se ferment pas, à la page 132 - à Open : SULPH., CALC., SIL.

Y L'ophtalmie des nouveau-nés : simple avec acon., sulph., hep., calc., dulc., arg-n., merc., euphr., rhus t.
purulente avec Arg-n.

N Les rhumes : ACON.

Le nez bouché qui gêne la tétée : Nux v., Samb., cham., dulc., carb-v.

Rhumes qui coulent et sont bouchés en même temps : ars.

O Les poussées d'otite aiguë avec Acon. donné toutes les cinq minutes jusqu'à cessation des douleurs.

Si insuffisant penser à puls. quand c'est à gauche;
et à merc. quand c'est à droite.

F La pâleur exagérée du nouveau-né : ant-t., ars., op.

- F La face chaude et le corps froid des petits bébés : Arn.
 La face trop rouge : Bell.
 La face cyanotique : lach., laur.
 Fentes derrière les oreilles : Sulph., Calc., graph.
- B Les aphtes : p. 397 : BOR., casc., Kali chl., MERC.,
Mur-ac., Nux m., Nux v., plan., sacch., sulph., SUL-AC.
 Le retard du langage : p. 86 : agar., bar-c., Bell. (à
 ajouter), calc-p., Caust. (à ajouter), NAT-M., nux m., phos.
 (à ajouter), sanic.
 Pour le bégaiement chez les enfants, les remèdes les plus
 utiles seront toujours BELL., CAUST., MERC., Plat., Sulph. et
 surtout STRAM., s'il lui faut s'exercer un long moment avant
 de pouvoir dire un mot; et euphrasia s'il doit recommencer tou-
 jours la même phrase.
- D Retard de la dentition : p. 431 - CALC., CALC-P., Fl-ac.,
 mag-c., mag-m., SIL.
Premiers troubles dentaires : Acon., Cham., Coff., calc.,
 op., bell., bor., kreos.
- E Les vomissements des nourrissons : Acon., hyosc., Aeth.
 Si insuffisant : nux v., puls., ars., ferr.
Hoquet des nouveau-nés : Acon., Nux v., bell., puls.
- A La constipation infantile : p. 606 (à ajouter dans le
 Répertoire et d'après Knerr) : acon., Ant-c., Bry., CALC., Cham.,
Graph., Hep., Hydr., Lyc., Mag-m., Nat-m., nit-ac., NUX V., OP.,
Plat., Plb., Podo., psor., Sep., Sil., sulph., verat.
Cas obstinés : ALUM.
Le choléra infantum : p. 606 : (diarrhée infantile cholé-
 rique) acon., AETH., ant-c., ant-t., Ars., Bell., Bism., Calc.,
 camph., carb-v., cham., colch., coloc., colost., corn., Crot-t.,
Dulc., elat., Ferr., grat., GUAJ., IP., Iris., jatr., kali bi.,
 kali br., Kreos., Laur., Mag-c., Med., nat-m., Op., Phos., podo.,
Psor., Puls., raph., Rhus t., sars., Sec., Sil., Stram., sulph.,
Tab., thuj., Verat.

Les diarrhées infantiles : p. 611 : Acon., AETH., Agar.,
agn., Apis, Arg-n., bar-c., Benz-ac., Bor., CALC., Calc-p.,
CALC-S., CHAM., Cina., Crot-t., Dulc., Ferr., Form., gamb.,
hell., IP., Iris., kreos., Mag-c., MAG-M., MERC-V., Mez., Nat-m.,
nux m., olnd., Phos., PODO., PSOR., Puls., RHEUM., sabad., samb.,
sep., SIL., stann., Staph., STRAM., SULPH., sul-ac., Valer.,
zinc.

Cas obstinés : Rheum.

Les selles à ressort: agn., eug., kali s., Lac d., Mag-m.,
Mur-ac., Nat-m., OP., Sanic., SIL., sulph., Thuya - p. 607.

L'impossibilité d'aller à selles sur le pot, mais seule-
ment en se levant du pot - p. 608 - CAUST.

Les hémorroïdes avec Mur-ac.

Écoulement d'urine par l'ombilic : hyosc.

Omphalite avec écoulement muqueux ou muco-purulent - p.
544 : Abrot., Calc., Calc-p., Kali c., lyc., Nat-m., nux m.,
stann.

avec écoulement sanguinolent : Calc., Calc-p.,
Nux m.

Pour les hernies ombilicales ou inguinales des nouveau-nés:
Aür., Nux v., Sulph.,

scrotales : Sul-ac.

Si c'est insuffisant, penser à verat., ant-c., lyc., cocc.,
cham.

Le prolapsus rectal : PODO., Ign., Nux., merc., Ferr.,
Ham.

Les gros ventres avec émaciation du reste du corps :
CALC., Sanic.

U Incontinence d'urine (énurésie) : BELL., Sulph., bacill.,
tub-bov., cina., rhus t.

Rétention urinaire des bébés : ACON., Apis., Ars., benz-ac., bry., Camph., Caust., erig., hyosc., Lyc., nux v., puls. (Kent et Jahr).

Rétention urinaire après violent accès de colère de la nurse : Op.

H L'asphyxie des nouveau-nés : p. 763 - répond à acon., ANT-T., Arn., Bell., CAMPH., Chin., Lach., Laur., Op.

L'asthme infantile : p. 764 : Acon., ambr., CHAM., IP., kali br., kali i., Mosch., NAT-S., nux v., psor., PULS., SAMB., stram., sulph.

La dyspnée infantile : p. 768 : Ambr., calc., calc-p., lyc., NAT-S., Puls.

Respiration râleuse avec mucus à la bouche : ip., ant-t.

L'arrêt de la respiration : cham.

La toux croupieuse : acon., ip.

" râleuse : samb.

Mastite des nouveau-nés (Intumescencia mammarum) : Cham., Bry., Arn., acon., bell.

S'il y a une induration marquée : Cham., Ars.

L'absence de pouls : acon.

Le retard dans la marche : p. 1223 : Agar., Bar-c., bell., CALC., CALC-P., CAUST., NAT-M., nux v., Sanic., Sil., sulph.

Pour les luxations spontanées des hanches, commencer par Rhus., puis Sulph., Calc-s. à de longs intervalles; avec occasionnellement Merc., puis Bell., comme intercurrents (Jahr).

S L'insomnie : CARC., COFF., Acon., Cham., Stict., Ars., Mag-m., Cyprip., Op., bell., ran-b.

W Les fièvres violentes : Camph., Acon.

Q Impétigo de la face : Acon., Ant-t., Viol-o., Rhus t.,
staph.

Croûte de lait : frotter avec jaune d'oeuf, puis laver
avec savon Lactacid - Ant-t., Rhus t., Viol-t., Graph.

Si adénite : am-c.

Eczéma des nouveau-nés : Dulc., Sulph.

Intertrigo (fesses rouges) : Cham., Sulph., graph., lyc.,
merc., calc.

Jaunisse des nouveau-nés : ACON., Bov., Cham., bry., Chin.,
MERC-VIV., Nat-s., Nux v., Podo., sep., sulph., ip., puls.;
quelquefois bell., dulc., ign.

Verrues : LYC., THUYA; cornées : Ant-c., psor.

Pour les naevi materni des nouveau-nés : CARB-V., et puis
CALC., Sulph., sep. et sil.

Naevus vasculosus, télangiectasies, angiomes stellaires :
CALC., carb-v., plat., thuya, rhus t., kreos., carb-an., ars.,
ruta, led., Am-m., Sep., Ip.

* * *

Cela n'est destiné qu'à vous stimuler à chercher dans les
Répertoires et compléter ce tableau qui sera, j'espère, apprécié
des pédiatres autant que des omnipraticiens, dont la clientèle
infantile est toujours assez importante.

Pour terminer, voici la rubrique que Kent avait dans sa
première édition sur les remèdes particulièrement indiqués chez
les enfants :

ACON., Aeth., agar., All-c., Ambr., Ant-c., ANT-T., arn., ars.,
asaf., Aur., Bar-c., BELL., BOR., Bry., CALC., Calc-p., camph.,
canth., CAPS., CHAM., chin., Cic., cina, clem., Cocc., coff.,
con., Croc., cupr., dig., dros., euph., ferr., Gels., graph.,

hell., HYOSC., Ign., Iod., IP., kali c., Kreos., Lach., laur.,
LYC., mag-c., MERC-SOL., mur-ac., nat-c., Nux m., nux v., OP.,
 plb., Podo., Psor., PULS., Rheum., rhus t., ruta, sabad., sabin.,
 sec., seneg., sep., SIL., spig., Spong., Squil., stann., staph.,
 sul-ac., SULPH., Teucr., thuj., verat., viol-o., viol-t., zinc.

Enfants rachitiques, malingres, débiles, chétifs : BAR-C.,
Calc., CALC-P., iod., lyc., merc., sec., Sil., SULPH., zinc.

* * *

Et pour terminer, un proverbe chinois :

"Il est plus facile de traiter dix hommes qu'une seule
 femme et dix femmes qu'un enfant" !

*

* *