

Antimonium Tartaricum d'après le «Decachord»

par le Dr Pierre SCHMIDT

1. Sujets flegmatiques; constitution hydrogéoïde.
- I 2. **Mauvaise humeur** constante et caractère inconciliable. Enfants grincheux, rechignés, désagréables, qui se plaignent constamment et s'irritent dès qu'on les approche et veut les toucher (Ant. C.); aggravés par la consolation.
3. Prostration avec grande **somnolence** et sueurs froides.
- H 4. Troubles respiratoires avec **grande accumulation de mucus** dans la poitrine; râles rauques; aucune puissance d'expulsion; cependant, s'il expectore, amélioration temporaire. Accès de dyspnée suffocante avec **cyanose**.
- E 5. Troubles gastriques avec nausées et vomissements; ces derniers améliorent temporairement (inverse pour *Ip.*). Dégoût de la nourriture; langue couverte d'un fort revêtement blanchâtre, humide; désir de choses acides (surtout pommes) qui aggravent. Aggravé par le lait.
- A 6. **Diarrhée cholérique**; selles limoneuses, généralement jaunes ou brunes, occasionnellement sanglantes.
- L 7. Douleur violente dans la région sacro-lombaire; le plus léger mouvement occasionne des vomissements et des sueurs froides.
- W 8. Fièvre avec frissons et impression marquée de froid; sensations de chaleur vive, mais de courte durée; pouls rapide et faible; transpiration abondante et épuisante. Soif d'eau par petites quantités et souvent (*Ars.*).
- Q 9. Eruptions pustuleuses étendues. Variole (*Variolin.*)
10. **Modalités**: agg. à la fois par la chaleur et par le froid, par temps humide, le soir vers la nuit, par la colère ou vexation.

CLARKE

- E 1. Un des meilleurs remèdes de la Nausée; de toute affection nauséuse et toujours amélioration par les vomissements.
- E 2. Nausées intenses et vomissements avec gros efforts, accompagnés de transpirations froides au front.
- I 3. Suite de colère et de vexation.
- I 4. L'enfant veut être porté, mais hurle, si on le touche.
5. Attaque d'évanouissement avec tremblement intérieur; sensation de poids ou lourdeur dans plusieurs parties du corps, tête, occiput, coccyx, membres.
6. C'est un sycotique.
- T 7. Tremblement chronique de la tête et des mains, comme dans la paralysie agitante.
- B 8. Langue très blanche avec érection de papilles rouges.
- N 9. Narines constamment dilatées.
- H 10. **Toux par la colère** chez les enfants dont le caractère est très désagréable, hargneux et irascible surtout avant la toux. Toux à **4 heures du matin**.
- H 11. Dans les *affections pulmonaires*, veut être couché avec tête basse.
- L 12. Excellent remède du *lumbago*.
- P 13. Verrues sur le dos *de la verge*.
- Q 14. Eruption *varioliforme* typique (symptôme utilisé pour la vaccination).

*

Complément de Clarke

- I L'enfant désire être porté et hurle si on le touche.
- C Impossible de prendre son pouls.
- Q **Variole** avec notalgies et céphalées. Toux avec poids sur la poitrine. Diarrhée. Pustules chroniques, indurées, sur les bras, poignets, ventre, côtés antérieurs et intérieurs des cuisses, très rouges, petites, avec base enflammée, extrêmement pruriantes. Eruption pustuleuse au visage, laissant une marque bleu-rougeâtre sur la face, les parties génitales, les cuisses,

etc. Eruptions douloureuses. L'éruption *ne sort pas*; a des convulsions. Varicelle. Eruption varioliforme souvent pustuleuse de la grosseur d'un pois.

*

SYMPTÔMES AU 3^e DEGRÉ DANS HERING

- I **Mauvaise humeur.**
- Y Vision floue comme à travers de l'eau. Ophthalmies rhumatismales et arthritiques.
- F Douleurs *déchirantes* d'un côté de la face, envahissant même la tête et à la nuque. **Pâleur** de la face. Faciès creux, cachectique (*sunken*).
- D Douleurs dentaires rhumatismales du type intermittent. Hypérémie catarrhale *pendant la dentition*.
- B **Langue très rouge**, sèche, au milieu surtout. Raie *rougeâtre sur la langue*. Langue saburale avec enduit épais, blanchâtre, pâteux.
- G **Dyspnée** avec accumulation de mucus dans la gorge.
- E **Aversion** de la nourriture, fréquentes nausées, améliorées par vomissements. Renvois soulagent (agg. *Cham.*, *Chin.*). **Nausées** causant de l'anxiété. **Nausées anxieuses**, persistantes, avec transpiration au front lors des efforts pour vomir. **Nausées**, vomissements et inappétence. Vomissements avec **de grands** efforts. Les vomissement sont suivis d'une grande langueur, somnolence avec désir de choses fraîches.
- A Coliques aiguës comme des tranchées avant la selle.
- H Asphyxia neonatorum, à la naissance, enfant pâle, n'arrivant pas à trouver sa respiration, suffoquant. Respiration **très râleuse** en toussant ou en respirant. Respiration râleuse, ronflante et sibilante des bronches supérieures pouvant s'entendre à grande distance. Respiration très râleuse par mucus dans la trachée qu'il ne peut expectorer. Bronchiectasie et **catarrhe des vieux**. Dyspnée par expectoration supprimée par des médicaments. Respiration irrégulière, courte, puis longue, plus fréquente couché. Respiration très râleuse et ronflante par mucus dans les voies respiratoires. Suffocation et oppression vers 3 heures du matin; doit s'asseoir pour

respirer; après avoir toussé et craché ça va mieux. Asphyxie accompagnée de somnolence, ou de coma. Soulage le râle des agonisants. Court accès de toux, avec un son striduleux dans la bronchite catarrhale. Quand l'enfant tousse, il semble terriblement encombré, mais rien n'est expectoré. Accès de toux avec grande difficulté pour respirer, surtout chez les enfants, accompagnés de pleurs et de tics de la face. Abondance de mucus dans les voies respiratoires, avec grande difficultés pour expectorer. Crachats abondants muqueux et faciles. Les accès de toux diminuent alors que le malade étouffe et montre des signes de carboxémie. Respiration avec râles ronflants, sibilants, bulleux, muqueux, crépitants, aggravée étendu, avec oppression. Catarrhe et inflammation des voies respiratoires. Grippe. Broncho-pneumonie. Crachats striés de sang, rouillés, collants. Atelectasie avec symptômes d'asphyxie avec œdème pulmonaire, orthopnée, râles muqueux. Œdème pulmonaire. Emphysème. Paralysie menaçante des poumons.

- C Pouls dur, plein et fort, quelquefois tremblant; accéléré par tout mouvement; presque imperceptible quand la fièvre tombe. Pouls faible, rapide et tremblant.
- L Violentes notalgies sacro-lombaires.
- X Tremblement des mains. Lourdeur des membres suivie d'une éruption lépreuse.
- Nerfs Prostration et collapsus.
- S *Forte somnolence, envie irrésistible de dormir dans presque toutes les affections.* Coma. Sommeil plein de rêves, tête comme engourdie au réveil le matin. Insomnie jusqu'au matin ou n'ayant que quelques heures de répit.
- Temps Aggravé la nuit et insomnie.
- Température Chaleur aggrave, même la chaleur du lit. Otagies, rhumatismes aggravés au printemps et en automne, quand le temps humide commence. Aggravé par l'eau froide.
- Q Peau avec transpiration ruisselante, mais collante.
- Tissus *Hydarthrose.* Inflammation des muqueuses, inflammation catarrhale, conjonctivites. Gastrite, entérite, laryngite, trachéite, bronchite, cystite. Eruptions pustuleuses, conjonctives, face, bouche et pharynx, œsophage, estomac, jejunum, parties génitales.